

Quels sont les signes cliniques chez le chien atteint de la Leishmaniose ?

<http://www.lasantedemonchien.fr/2018/01/16/signes-cliniques-leishmaniose/>

Tous les chiens infectés ne développent pas la maladie (1 chien malade pour 3 à 5 chiens infectés par le parasite). **L'incubation de la maladie peut être très longue**, de plusieurs mois à plusieurs années. Les animaux les plus sensibles déclenchent la maladie dans les mois qui suivent l'infection par la piqûre du phlébotome. D'autres resteront porteurs du parasite pendant plusieurs années et ne deviendront cliniquement malades qu'en vieillissant ou à l'occasion de stress divers. **L'expression clinique de la leishmaniose est très variée**, car c'est une maladie générale polymorphe qui peut atteindre tous les organes, tissus ou fluides de l'organisme, et les signes cliniques ne sont pas spécifiques.

Dans sa forme classique, les principaux signes cliniques sont :

~~signes-cliniques-leishmaniose~~

Le diagnostic de certitude sur la clinique seule est difficile. Des examens complémentaires et des **analyses de laboratoire (examens biologiques, mise en évidence du parasite chez le chien, examens sérologiques...)** sont nécessaires pour confirmer la suspicion clinique et établir le degré de gravité (de I léger à IV très sévère).

Vous souhaitez en savoir plus sur les traitements ?

[Cliquez ici >](#)